

REQUISITOS DE ADMISION Y ASIGNACION DE CITAS :

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Autorización para el estudio de las muestras producto de la biopsia (patología).
4. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
5. Si toma anticoagulantes como warfarina, heparina o Acido Acetil Salicílico informar al personal de citas. En caso de requerir suspensión de dichos medicamentos solicitar autorización del médico tratante.
6. Informar al personal de citas sobre historia de alergias, medicamentos, alimentos y/o medios de contraste.
7. Traer los resultados del antígeno prostático, TPT, TP y recuento de plaquetas (con una vigencia no mayor a un mes), para ser evaluados por el radiólogo y poder programarlo para el examen.

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN

Aproximadamente 2 horas.

DIA ANTERIOR AL EXAMEN:

1. Ingerir una tableta de Cipro o ciprofloxacina de 500 mg (antibiótico) a las 7 de la noche y en la mañana antes de asistir al examen y continuar cada 12 horas por tres días. (8 Tabletas)
2. Comprar un enema travad rectal de 133 cc. el cual debe ser puesto por vía rectal 2 horas antes del estudio siguiendo las instrucciones que trae al respaldo.

DIA DEL EXAMEN:

1. Ayuno mínimo de cuatro horas.
2. Presentarse una hora antes del examen para preparar al usuario previo a la realización
3. Si toma medicamentos de control, ingerirlos con un poco de agua. **NO SUSPENDER.**
4. Asistir a la cita con un acompañante **ADULTO RESPONSABLE.**
5. Asistir con el resultado de los exámenes de laboratorio: antígeno prostático, TP-TPT, recuento de plaquetas (con vigencia no mayor a un mes).
6. Aplicar de manera rectal 2 horas antes del examen un enema (Travad rectal de 133 cc), siguiendo las instrucciones que trae al respaldo.
7. Traer los estudios radiológicos relacionados con el examen a realizar.
8. Presentarse 20 minutos antes de la hora del examen.
9. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

CUIDADOS POSTERIORES:

1. Guardar reposo el resto del día.
2. Ingerir alimentos livianos posterior al examen: sopa, jugo, no ingerir leche.
3. Continuar con la medicación de control, a menos que el médico que le realizó el procedimiento le dé una orden especial. Reiniciar la toma del ácido acetil salicílico – ASA (aspirina) o anticoagulantes (Warfarina, Coumadin) el día después del examen.
4. Puede presentar un pequeño sangrado hasta por tres días por orina, materia fecal o eyaculación; si el sangrado es abundante debe consultar por urgencias.
5. En caso de dolor puede tomar analgésicos tipo acetaminofen, no derivados de ácido acetil salicílico (aspirina).