

REQUISITOS DE ADMISION Y ASIGNACION DE CITAS:

1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Autorización para el estudio de las muestras producto de la biopsia (patología), dicha muestra debe ser remitida a la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Bogotá.
4. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
5. Si toma anticoagulantes como warfarina, heparina o Acido Acetil Salicílico informar al personal de citas. En caso de requerir suspensión de dichos medicamentos solicitar autorización del médico tratante.
6. Informar al personal de citas sobre historia de alergias a medicamentos, alimentos y/o medios de contraste, así como también, reportar si está embarazada o tiene sospecha.
7. Si además de la biopsia el paciente requiere una tomografía con medio de contraste, debe realizarse el examen de creatinina el cual debe estar vigente y no superior a 30 días.
8. En los últimos ocho (8) días no debe haber tenido estudios con medio de contraste baritado.

DURACIÓN DEL EXAMEN:

Aproximadamente 1 hora para el procedimiento.

DIA DEL EXAMEN:

1. Presentarse 1 hora antes del examen para prepararlo.
2. Traer el resultado de los exámenes de laboratorio TP-TPT- Recuento de plaquetas.
3. Si toma medicamentos de control para enfermedades como hipertensión arterial y/o diabetes, ingerirlos con poca agua. **NO SUSPENDER.**
4. Traer nevera de icopor para transporte de la muestra, así como bolsas de agua congelada (no hielo seco).
5. Asistir con 2 acompañantes **ADULTOS Y RESPONSABLES.**
6. Traer los estudios radiológicos anteriores relacionados con el examen a realizar.
7. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias.

CUIDADOS POSTERIORES:

1. Permanecer de 6 a 8 horas en reposo absoluto en el área de recuperación.
2. Debe desplazarse a su casa en carro o ambulancia, preferiblemente acostado.
3. Guardar reposo el resto del día y acostarse sobre el lado de la punción para hacer presión y evitar sangrado.
4. No realizar esfuerzos al día siguiente del examen.
5. Dieta normal y medicación acostumbrada, a menos que el médico que realizo el procedimiento le dé una orden especial.
6. Si aparece hematoma o sangrado en el sitio de la punción, comunicarse de inmediato con el médico tratante o consultar por urgencias.
7. En caso de dolor en el sitio de punción, puede tomar analgésicos tipo acetaminofen. No derivados de la aspirina.

**APROBO: Dra. Maria Teresa Saldarriaga M.
DIRECTOR DE SALUD**

**VIGENCIA A PARTIR DE
FEBRERO 8 DE 2011**